



## **PAX3 Breakapart Probe**


**RÉF.: LPS 012-A** 

Réactif spécifique à un analyte : les caractéristiques de performance et d'analyse ne sont pas établies.

L'hybridation *in situ* en fluorescence (FISH) est une technique qui permet aux séquences d'ADN d'être détectées sur les chromosomes métaphasiques ou dans les noyaux interphasiques d'échantillons cytogénétiques fixés. Elle emploie des sondes d'ADN qui s'hybrident au chromosome entier ou à des séquences simples uniques et sert de puissant complément à la cytogénétique traditionnelle. De récentes avancées font que cette précieuse technique peut désormais être appliquée comme outil essentiel dans le cadre de l'analyse chromosomique prénatale, hématologique et pathologique. L'ADN cible, une fois fixé et dénaturé, peut être recuit sur une sonde d'ADN dénaturée de façon similaire et marquée par fluorescence qui est équipée d'une séquence complémentaire. Après l'hybridation, la sonde d'ADN non liée et nonspécifiquement liée est retirée, et l'ADN est contrecoloré en vue de la visualisation. La microscopie en fluorescence permet ensuite de visualiser la sonde hybridée sur le matériau cible.

## Caractéristiques des sondes

Sonde de la région PAX3, 2q36.1 en rouge Sonde de la région PAX3, 2q36.1 en vert



La sonde PAX3 est composée d'une sonde verte (168kb) et d'une sonde rouge (124kb) positionnées sur chaque côté du gène PAX3.

## Matériaux fournis

Sonde: 100µl par flacon

 $\textbf{Concentration de la sonde:} \qquad \text{Quantit\'e de sonde rouge: } 7.00-11.8\,\text{ng/}\mu\text{I}$ 

Quantité de sonde vert : 27.4 - 41.0 ng/µl

La sonde est fournie dans une solution d'hybridation (formamide; sulfate de dextrane; SSC) et prête à l'emploi.

### Avertissements et précautions

- 1. Pour une utilisation professionnelle uniquement.
- 2. Portez des gants lors de la manipulation des sondes d'ADN.
- La sonde contient du formamide, qui est tératogène. N'inhalez pas les vapeurs
  et évitez tout contact avec la peau. Portez des gants et une blouse de
  laboratoire, et manipulez sous une hotte. Lors de la mise au rebut, rincez avec
  une grande quantité d'eau.
- Mettez au rebut toutes les matières dangereuses conformément aux directives de votre institution en matière de mise au rebut des déchets dangereux.
- Visuellement, les opérateurs doivent être en mesure de faire la différence entre le rouge, le bleu et le vert.

### Stockage et manipulation

Stockez la sonde entre -25°C et -15°C jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette. Stockez la sonde à l'abri de la lumière. Assurez-vous que la sonde n'est exposée aux lumières de laboratoire que de façon limitée, à tous moments.

# Réaction croisée connue

Aucune réactivité croisée connue.

#### Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur le produit, contactez le Service d'assistance technique

CytoCell.

Tél.:+44 (0)1223 294048

E-mail: techsupport@cytocell.com

Site Web: www.ogt.com

### Légende des symboles utilisés

REF	fr: Référence du catalogue
IVD	fr: Dispositif médical de diagnostic in vitro
LOT	fr: Code du lot
Ţį	fr: Consulter la notice d'utilisation
***	fr: Fabricant
$\square$	fr: Utiliser jusqu'au
-25°C-	fr: Limites de température
CONT	fr: Contenu

### Brevets et marques déposées

CytoCell est une marque commerciale de Cytocell Ltd.



### Cytocell Ltd.

Oxford Gene Technology, 418 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4 0PZ, UK

Tél.: +44(0)1223 294048 Télécopie: +44(0)1223 294986 E-mail: probes@cytocell.com Site Web: www.ogt.com